

EP 54675

1/9/1

DIALOG(R)File 351:Derwent WPI

(c) 2004 Thomson Derwent. All rts. reserv.

003507203 WPI Acc No: 1982-55183E/198227

Enzyme immunoassay in centrifugal rotor - measuring enzyme activity
without phase sepn.

Patent Assignee: BOEHRINGER MANNHEIM GMBH (BOEF)

Inventor: ALBERT W; EVANEGA G R

Number of Countries: 015 Number of Patents: 009

Patent Family:

| Patent No | Kind | Date | Applicat No | Kind | Date | Week |
|-------------|------|----------|-------------|------|----------|----------|
| EP 54675 | A | 19820630 | EP 81108754 | A | 19811022 | 198227 B |
| DE 3048884 | A | 19820715 | | | | 198229 |
| JP 57132060 | A | 19820816 | JP 81206303 | A | 19811222 | 198238 |
| DD 201943 | A | 19830817 | | | | 198350 |
| CA 1170180 | A | 19840703 | | | | 198431 |
| EP 54675 | B | 19850515 | | | | 198520 |
| DE 3170532 | G | 19850620 | | | | 198526 |
| JP 87032422 | B | 19870714 | | | | 198731 |
| US 4743536 | A | 19880510 | US 81331339 | A | 19811216 | 198821 |

Priority Applications (No Type Date): DE 3048884 A 19801223

Cited Patents: DE 2164768; DE 2736527; DE 2907198; DE 2938646; FR 2365124;
FR 2418463; US 3839153; 1.Jnl.Ref

Patent Details:

| Patent No | Kind | Lan | Pg | Main IPC | Filing Notes |
|-----------|------|-----|----|----------|--------------|
|-----------|------|-----|----|----------|--------------|

| | | | | | |
|----------|---|---|----|--|--|
| EP 54675 | A | G | 15 | | |
|----------|---|---|----|--|--|

Designated States (Regional): AT BE CH DE FR GB IT LI LU NL SE

| | | | | | |
|----------|---|---|--|--|--|
| EP 54675 | B | G | | | |
|----------|---|---|--|--|--|

Designated States (Regional): AT BE CH DE FR GB IT LI LU NL SE

Abstract (Basic): EP 54675 A

Method for determining one component of a specific binding-protein-binding substance pair comprises incubating a test sample with (1) a predetermined amt. of insolubilised binding component (A) and (2) a reagent contg. a known amt. of one component in enzyme-labelled form. The enzyme content of the liq. phase is then measured in a centrifugal rotor during or after application of a high gravitational force, for as long as the liq. and solid phases are in contact.

(A) are pref. insolubilised by immobilisation on a carrier and/or by crosslinking, esp. they are bonded to latex particles. (A) is esp. an antibody or anti-antibody and the enzyme-labelled component (B) an antigen, hapten, antibody or anti-antibody. Alternatively, (A) is the antigen or hapten and (B) the antibody.

The method is more suited to automation than known ELISA procedures since sepn. of solid and liq. phases and washing are unnecessary and commercial centrifugal analysers can be used. In the presence of a strong gravitational force, bound enzyme takes no part in the enzymatic reaction.

Title Terms: ENZYME; IMMUNOASSAY; CENTRIFUGE; ROTOR; MEASURE; ENZYME;
ACTIVE; PHASE; SEPARATE

Derwent Class: B04; D16; S03

International Patent Class (Additional): C12Q-001/00; G01N-033/54

File Segment: CPI; EPI



Europäisches Patentamt
European Patent Office
Office européen des brevets

Veröffentlichungsnummer:

0 054 675

A1

12

EUROPÄISCHE PATENTANMELDUNG

21 Anmeldenummer: 81108754.3

51 Int. Cl.²: **G 01 N 33/54**

22 Anmeldetag: 22.10.81

30 Priorität: 23.12.80 DE 3048884

71 Anmelder: **BOEHRINGER MANNHEIM GMBH**,
Sandhofer Strasse 112-132 Postfach 31 01 20,
D-6800 Mannheim 31-Waldhof (DE)

43 Veröffentlichungstag der Anmeldung: 30.06.82
Patentblatt 82/26


72 Erfinder: Evanega, George R., Dr., 3705 Carmel Drive,
Carmel, IN 46032 (US)
Erfinder: Albert, Winfried, Dr., Moosstrasse 10,
D-8121 Pahl (DE)

84 Benannte Vertragsstaaten: AT BE CH DE FR GB IT LI LU
NL SE

74 Vertreter: Weickmann, Heinrich, Dipl.-Ing Patentanwälte
Dipl.-Ing. H. Weickmann et al, Dipl.-Phys. Dr. K. Fincke
Dipl.-Ing. F. A. Weickmann Dipl.-Chem. B. Huber,
Dr.-Ing. H. Liska Möhlstrasse 22, D-8000 München 86 (DE)

54 Verfahren zur Enzymimmunbestimmung in heterogener Phase.

57 Zur Bestimmung einer Komponente der Reaktion zwischen einem spezifisch bildenden Protein und einer damit bindefähigen Substanz durch Inkubation einer Probelösung mit einer vorher festgelegten Menge Bindungskomponente in unlöslicher Form in Gegenwart eines Reagens, welches eine bekannte Menge einer der Bindungskomponenten in enzymmarkierter Form enthält, Trennung der flüssigen von der festen Phase durch Zentrifugieren und Bestimmung der in der flüssigen Phase verbliebenen Aktivität des Markierungsenzyms führt die Messung der Enzymaktivität in einem Zentrifugenrotor während oder nach der Einwirkung der erhöhten Schwerkraft durch solange feste und flüssige Phase noch miteinander in Kontakt stehen.



EP 0 054 675 A1

Verfahren zur Enzymimmunobestimmung in heterogener Phase.

Die Erfindung betrifft ein Verfahren zur Bestimmung einer Komponente der Reaktion zwischen einem spezifisch bindenden Protein und einer damit bindefähigen Substanz unter Anwendung des Prinzips des Enzymimmuno-Verfahrens in heterogener Phase.

Aufgrund der ständig steigenden Zahl von klinisch-chemischen Analysen von Serumbestandteilen und ähnlichen biologischen Materialien gewinnt die Automatisierbarkeit derartiger Methoden ständig weiter an Bedeutung. Nur durch Automatisierung läßt sich die stark steigende Zahl derartiger Bestimmungen bewältigen und dabei auch der erforderliche Arbeitsaufwand pro Bestimmung herabsetzen. In neuerer Zeit haben dabei Analysenautomaten, die auf dem Zentrifugalanalysenprinzip beruhen, große Bedeutung erlangt, da sie eine weitere Erhöhung der Analysenfrequenz ohne besondere Steigerung der Anlagenkosten ermöglicht (G-i-T, Fachz. Lab. 21 (1977), 866-874).

Für die klinische Diagnostik steigt in neuerer Zeit auch die Bedeutung von Verfahren zur Bestimmung von Partnern von Immunreaktionen. Einen wesentlichen Fortschritt brachte dabei die Methode der Radioimmunanalyse (RIA), da sie eine wesentliche Erhöhung der Empfindlichkeit derartiger Bestimmungen mit sich brachte. Ein Nachteil des RIA, nämlich die Notwendigkeit, mit radioaktiven Substanzen umzugehen,

- 1 wurde beseitigt durch den Ersatz der radioaktiven Markie-
rung durch eine Enzymmarkierung, was zum sogenannten Enzym-
Immuno-Assay (EIA) führte. Bei einer Ausführungsform eines
5 bezeichnet wird, wird eine Komponente der Reaktion zwischen
einem spezifisch bindenden Protein und einer damit binde-
fähigen Substanz bestimmt, indem man eine Probelösung mit
unbekanntem Gehalt an der zu bestimmenden Substanz mit
einer vorher festgelegten Menge einer Bindungskomponente
10 in unlöslicher Form in Gegenwart eines Reagenz inkubiert,
welche eine bekannte Menge einer der Bindungskomponenten
in enzymmarkierter Form enthält. Nach Trennung der flüs-
sigen von der festen Phase stellt die in der flüssigen
Phase verbliebene Aktivität des Markierungsenzyms ein Maß
15 für die in der Probelösung vorhandene unbekannte Menge
der zu bestimmenden Komponente der Immunreaktion dar (vgl.
J. Clin. Chem. Clin. Biochem. Vol. 18 (1980) 197-208).
Dieser heterogene Enzymimmunotest beseitigt zwar die Not-
wendigkeit, mit radioaktiven Substanzen zu arbeiten, der
20 dabei erforderliche Trennungsschritt bereitet jedoch bei
der Automatisierung Schwierigkeiten und erfordert zusätz-
liche Maßnahmen, wie sie beispielsweise in der DE-OS 27 36
527 beschrieben werden.
- 25 Der Erfindung liegt nun die Aufgabe zugrunde, ein der-
artiges Enzym-Immuno-Testverfahren so zu gestalten, daß
die Automatisierbarkeit verbessert wird und insbesondere
eine Durchführung an Zentrifugalanalysatoren ermöglicht
wird.
- 30
- Gelöst wird diese Aufgabe erfindungsgemäß durch ein Ver-
fahren zur Bestimmung einer Komponente der Reaktion zwi-
schen einem spezifisch bindenden Protein und einer da-
mit bindefähigen Substanz durch Inkubation einer Probe-
35 lösung mit einer vorher festgelegten Menge Bindungskom-
ponente in unlöslicher Form in Gegenwart eines Reagenz,

- 1 welches eine bekannte Menge einer der Bindungskomponenten
in enzymmarkierter Form enthält, Trennung der flüssigen
von der festen Phase durch Zentrifugieren und Bestimmung
der in der flüssigen Phase verbliebenen Aktivität des Mar-
5 kierungsenzyms, welches dadurch gekennzeichnet ist, daß
man die Messung der Enzymaktivität in einem Zentrifugen-
rotor während oder nach der Einwirkung der erhöhten Schwer-
kraft durchführt, solange feste und flüssige Phase noch
miteinander in Kontakt stehen.
- 10 Die Erfindung beruht auf der sehr überraschenden Tatsache,
daß unter dem Einfluß der Schwerkraft in einem Zentrifugen-
rotor der an die feste Phase gebundene Anteil des Enzyms
an der Enzymreaktion praktisch nicht teilnimmt, so daß
15 unter den erfindungsgemäßen Bedingungen bei der Messung
der Enzymaktivität nur das in der flüssigen Phase vorlie-
gende Enzym wirksam wird, während das damit in direktem
Kontakt stehende, infolge der Einwirkung der erhöhten
Schwerkraft aber an die Behälterwand gebundene Enzym bei
20 der Bestimmung nicht erfaßt wird. Bei einem Zentrifugal-
analysator werden ja die Komponenten einer Reaktion üb-
licherweise zuerst unter dem Einfluß der Schwerkraft ge-
mischt und dann in ein Bestimmungsgefäß weitergefördert,
welches als eine Art Küvette ausgebildet ist, in der wäh-
25 rend des Rotorlaufs die Messung durchgeführt wird. An der
Küvettenwand, auf welche die Schwerkraft wirkt, sammelt
sich nun beim Verfahren der Erfindung das an die feste Pha-
se gebundene Markerenzym an, wird also insoweit zwar dem
Lichtstrahl, der für die Messung durch die Küvette ge-
30 schickt wird, entzogen, bleibt aber weiterhin in Kontakt
mit der Reagenzlösung und kann daher auch an Umsetzungen
in der Reagenzlösung weiter teilnehmen. Diese Teilnahme
von in fester Phase gebundenen Enzymen an Reaktionen in
der Lösung wird gerade bei den trägergebundenen Enzymen
35 technisch in weitem Umfang ausgenutzt. Falls man überhaupt
eine Einwirkung des Schwerkraftfelds bei derartigen Reak-

1 tionen erwartet hätte, so allenfalls eine verstärkte Teil-
nahme des an die Behälterwand zentrifugierten Enzyms, da
eine Wanderung der Reaktionspartner unter dem Einfluß der
Schwerkraft, wenn überhaupt, so nur in Richtung ihrer Wir-
5 kung, d.h. zum in fester Phase vorliegenden Enzym, aber
nicht vom Festphasenenzym weg zu erwarten war.

Die Erfindung macht es möglich, die bis jetzt als abso-
lut unumgänglich angesehenen Verfahrensschritte: Trennung
10 von fester und flüssiger Phase und Waschen der festen Pha-
se (Dt. Ges. f. Klin. Chemie, Mitteilungen 1/79,
22-30), überflüssig gemacht werden und das Verfahren auf
üblichen Zentrifugenanalysatoren durchführbar wird. Das
wesentliche Hindernis bei der Durchführung der ELISA-
15 Technik auf Analysenautomaten wird damit beseitigt.

Die unlösliche Komponente der Enzymreaktion wird beim er-
findungsgemäßen Verfahren vorzugsweise in trägergebundener
Form eingesetzt. Die Trägerbindung kann nach den für die
20 Immobilisierung von biologisch aktiven Substanzen dem Fach-
mann bekannten Methoden erfolgen. Alternativ kann die un-
lösliche Komponente auch in vernetzter Form eingesetzt
werden, beispielsweise durch an sich bekannte Umsetzung
mit multifunktionalen Vernetzungsmitteln. Derartige Ver-
25 netzungsmittel, wie Glutardialdehyd, usw. sind dem Fach-
mann bekannt und brauchen hier nicht näher erläutert zu wer-
den. Vernetzung und Trägerfixierung können auch kombiniert
angewendet werden, indem eine Komponente der Immunreaktion
auf einem Träger durch Vernetzung fixiert wird. Besonders
30 zweckmäßig wird die unlösliche Komponente in Teilchenform
eingesetzt, entweder an einen teilförmigen Träger fixiert
oder durch trägerfreie Vernetzung in Teilchenform über-
führt.

35 Der Träger für die unlösliche Komponente kann, wenn er
verwendet wird, flüssig oder fest sein. Gemäß einer be-
sonders bevorzugten Ausführungsform der Erfindung setzt

- 1 man die unlösliche Komponente der Immunreaktion an Latex-
teilchen gebunden ein. Ein besonderer Vorzug von Latex-
partikeln liegt in ihrer Dichte, die sie in wäßriger Lö-
sung in Schwebel hält. Zu diesem Zweck besonders geeignete
5 Latexpartikel sind in der gleichzeitig unter der internen
Nr. 2350 unter der Bezeichnung "Hydrophile Latexpartikel,
Verfahren zu deren Herstellung und deren Verwendung" ein-
gereichten Patentanmeldung beschrieben (Kopie beigelegt).
Diese hydrophilen Latexpartikel bestehen aus einem Homo-
10 oder Copolymerisat von in Wasser schwerlöslichen Monomeren
und sind durch Emulsionspolymerisation in Anwesenheit eines
wasserlöslichen, Radikale bildenden Initiators, jedoch ohne
Zusatz eines Emulgators, Stabilisators oder Netzmittels,
herstellbar. Die Herstellung erfolgt in wäßriger Disper-
15 sion des oder der Monomeren durch Emulsionspolymerisation
in Abwesenheit von Sauerstoff.

Im Rahmen der Erfindung sind jedoch auch andere Träger ge-
eignet, wie sie üblicherweise für die Fixierung von biolo-
20 gisch aktiven Proteinen verwendet werden, beispielsweise
unlösliche Kohlenhydrate, wie Cellulosederivate, vernetz-
tes Dextran, hydrophile Polymere und Copolymere, insbe-
sondere auf Basis von Acrylamid und dergleichen.

- 25 Die im Rahmen der Erfindung erforderliche Schwerkraft ent-
spricht den bei handelsüblichen Zentrifugalanalysenauto-
maten normalerweise auftretenden Werten.

Alle übrigen Bedingungen, die beim Verfahren einzuhalten
30 sind, entsprechen den für die jeweilige Bestimmung nach
der ELISA-Technik bekannten Bedingungen. Sie werden im
wesentlichen durch die pH- und Puffer-Abhängigkeit des
Markerenzym bestimmt. Diese Bedingungen sind dem Fachmann
bekannt. Auch Konzentrationen und Inkubationszeiten können
35 den bisher bekannten Werten entsprechen.

1 Auch hinsichtlich der verwendbaren Markerenzyme bestehen keine Beschränkungen. Alle für die ELISA-Technik geeigneten Markerenzyme lassen sich auch im Rahmen der Erfindung anwenden.

5

Das erfindungsgemäße Verfahren eignet sich für die verschiedenen bekannten Abwandlungen der ELISA-Technik, also die sogenannte kompetitive Enzym-Immuno-Testmethode, die kompetitive Sandwich-Methode, die Sandwich-Antigen-Methode, die Sandwich-Antikörper-Methode und die immuno-enzymometrische Methode. Diese Methoden sind in der oben erwähnten Literaturstelle J. Clin. Chem. Clin. Biochem. schematisch erläutert. Beispiele für geeignete Markerenzyme sind Peroxidase, Glucoseoxidase, Galactosidase, alkalische Phosphatase, Glucoamylase, Acetylcholinesterase und Katalase.

Typische Beispiele für Antigene oder Haptene, die mit dem erfindungsgemäßen Verfahren bestimmt werden können, sind Thyroxin, Digoxin, Östriol, α_1 -Fetoprotein, Insulin, Thyrotropin, Ferritin, carcinoembryonales Antigen, HB₂-Antigen und ähnliche. In gleicher Weise können die korrespondierenden oder beliebige andere Antikörper bestimmt werden.

25

Die folgenden Beispiele erläutern die Erfindung weiter.

B e i s p i e l 1

30 Verwendete Reagenzien:

a) Sepharose-Anti-T₄-Antikörper (T₄ = Tetrajod-Tyrosin = Thyroxin)

1 g handelsübliche bromcyanaktivierte vernetzte Agarose (Sephase) wurde nach Vorschrift des Herstellers mit 10 ml Anti-T₄-Immunglobulin (Anti-T₄-IgG von Kaninchen) gekuppelt, wobei das Anti-T₄-IgG aus Anti-T₄-An-

1 tiserum durch Fällung mit 14 %-iger (w/v) Ammonium-
sulfatlösung gewonnen worden ist (Probelösung)

b) T_4 -Glucoseoxidase (T_4 -GOD)

5 200 mg (= 1.07 μ M) lyophilisierte Glucoseoxidase werden
in 20 ml 0,1 M Phosphatpuffer, pH 8,6, gelöst und trop-
fenweise unter Kühlen und Rühren mit 18,8 ml Dimethyl-
formamid versetzt. Zu dieser Lösung werden 15 mg (= 15,4 μ M) BOC- T_4 -OSu (Su = Succinimid), in 1,2 ml Dime-
10 thylformamid gelöst, innerhalb 3 Stunden in 400 μ l-
Portionen zugesetzt. Die Reaktionslösung wird 20 Stun-
den bei 4°C unter Rühren und Lichtausschluß gehalten.
Eine auftretende leichte Trübung wird abzentrifugiert.
Die überstehende Lösung wird an Molekularsieb auf Ba-
15 sis von vernetztem Dextran (Sephasex G-25, fine) in
40 mM Tris-Puffer, pH 7,5, und 150 mM Natriumchlorid
aufgetrennt. Die erste Fraktion (Front) wird aufgefan-
gen: 86 ml. Die erhaltene Lösung wird zweimal gegen
12 l 40 mM Phosphatpuffer, pH 6,5, dialysiert. Die so
20 erhaltene GOD- T_4 enthaltende Lösung wird für die folgen-
den Experimente im Verhältnis 1 : 10 mit Phosphatpuf-
fer, pH 6,5, verdünnt.

c) Enzymsubstratlösung

25 20 mg Peroxidase (POD), 4,6 g 2,2'-Azino-di-[3-äthyl-
benzthiazolinsulfonat(6)] und 50 g Glucose werden mit
0,01 M Phosphat/Citrat-Puffer, pH 5,6, und 0,1 % Poly-
oxyäthylensorbitanmonooleat (Tween 20) auf ein Endvo-
lumen von 1 l gebracht.

d) Versuchsdurchführung

Verschiedene, jeweils bekannte Menge an der unter a)
beschriebenen Sepharose-Anti- T_4 -IgG-Lösung (50/100/200/
500/1000 μ l) werden mit jeweils 100 μ l der unter b) be-
35 schriebenen T_4 -GOD-Lösung vermischt und 15 Minuten
bei Raumtemperatur gerührt. 35 μ l dieses Inkubationsge-

1 misches werden in die Probemulde eines handelsüblichen
Zentrifugalanalysenautomaten (CentrifiChem 400) gege-
ben. In den Reagenzbereich werden 60µl des unter c) be-
schriebenen Enzymsubstrat-Gemisches gefüllt. Danach
5 wird zentrifugiert und währenddessen die Extinktion bei
405 nm gemessen. Fig. 1 der Zeichnung zeigt in graphi-
scher Darstellung die Abnahme der Extinktion, gemessen
nach 25 Minuten ab Beginn der Zentrifugation, gegen die
Zunahme des Sepharose-Anti-T₄-IgG-Gehalts aufgetragen.

10

B e i s p i e l 2

100 µl Sepharose-Anti-T₄-IgG, 9-0 µl 0,1 M Phosphatpuffer,
pH 7,0, 100 µl T₄-GOD-Lösung und 100 µl eines T₄-Standards
15 in 0,1 M Phosphatpuffer, pH 7,0, werden 1 Stunde gerührt.
35 µl dieses Inkubationsgemisches werden wie in Beispiel 1
d) beschrieben am Zentrifugalanalysenautomaten weiterbe-
handelt. Durch Einsatz von T₄-Standardlösungen unterschied-
lichen T₄-Gehalts wird eine Eichkurve erstellt. Die ermit-
20 telten Werte sind in Fig. 2 dargestellt. Anhand dieser
Eichkurve lassen sich unbekannte T₄-Konzentrationen be-
stimmen. Hierzu wird in der oben beschriebenen Weise ver-
fahren, jedoch wird anstelle der T₄-Standardlösung eine
entsprechende Menge der Probe mit unbekanntem T₄-Gehalt
25 eingesetzt.

B e i s p i e l 3

Verwendete Reagenzien

30

a) Latex-Anti-T₄-Antikörper

T₄-Antikörper aus einem Anti-T₄-Serum vom Schaf werden
an Homopolyglycidylmethacrylat-Latexpartikel (herge-
stellt nach Patentanmeldung P ..., interne Nr. 2350)
35 in der dort angegebenen Weise kovalent gebunden.

- 1 b) T_4 - β -Galactosidase (T_4 - β -Gal)

T_4 wird analog Beispiel 1 b) mit β -Gal markiert.

- c) β -Gal-Substratlösung

5 450 mg/l p-Nitrophenyl- β -galactosidase (Fa. Sigma)

100 mM Natriumchlorid

10 mM Magnesiumchlorid

10 mM Tris-Puffer/HCl, pH-Wert 7,3

0,4 % (V/) Mercaptoäthanol

10

- d) Versuchsdurchführung

0,5 ml einer verdünnten Latex-Anti- T_4 -Suspension werden mit 100 μ l einer T_4 -Serum-Standardlösung mit verschiedenem, jeweils bekanntem T_4 -Behalt und 100 μ l

15 einer T_4 - β -Gal-Konjugatlösung versetzt. Das Reaktionsgemisch wird 30 Minuten bei Raumtemperatur stehen gelassen. 35 μ l des jeweiligen Inkubationsgemisches werden in die Probemulde eines handelsüblichen Zentrifugalanalysenautomaten (CentrifiChem 400) gegeben.

20 In den Reagenzbereich dieses Zentrifugalanalysators werden 60 μ l der unter c) beschriebenen Substratlösung gefüllt. Danach wird zentrifugiert und die Extinktion bei einer Wellenlänge von 405 nm gemessen.

25 Nachdem auf diese Weise die T_4 -Eichkurve ermittelt wurde, wurden anschließend in derselben Weise Bestimmungen durchgeführt, bei denen anstelle von 100 μ l T_4 -Standardserum jeweils 100 μ l von Proben mit unbekanntem T_4 -Gehalt eingesetzt wurden.

30

35

1

Patentansprüche

1. Verfahren zur Bestimmung einer Komponente der Reaktion zwischen einem spezifisch bindenden Protein und einer damit bindefähigen Substanz durch Inkubation einer Probelösung mit einer vorher festgelegten Menge Bindungskomponente in unlöslicher Form in Gegenwart eines Reagenz, welches eine bekannte Menge einer der Bindungskomponenten in enzymmarkierter Form enthält, Trennung der flüssigen von der festen Phase durch Zentrifugieren und Bestimmung der in der flüssigen Phase verbliebenen Aktivität des Markierungsenzyms, dadurch gekennzeichnet, daß man die Messung der Enzymaktivität in einem Zentrifugenrotor während oder nach der Einwirkung der erhöhten Schwerkraft durchführt, solange feste und flüssige Phase noch miteinander in Kontakt stehen.
2. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß man die unlösliche Komponente in trägergebundener Form einsetzt.
3. Verfahren nach Anspruch 1 oder 2, dadurch gekennzeichnet, daß man die unlösliche Komponente in vernetzter Form einsetzt.
4. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 3, dadurch gekennzeichnet, daß man die unlösliche Komponente in Teilchenform einsetzt.
5. Verfahren nach Anspruch 4, dadurch gekennzeichnet, daß man die unlösliche Komponente an Latexteilchen gebunden einsetzt.
6. Verfahren nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, daß man als unlösliche Komponente einen Antikörper oder Anti-Antikörper verwendet.

- 1 7. Verfahren nach Anspruch 7, dadurch gekennzeichnet, daß
man als enzymmarkierte Komponente ein Antigen, Hapten,
einen Antikörper oder einen Anti-Antikörper verwendet.
- 5 8. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 6, dadurch
gekennzeichnet, daß man als unlösliche Komponente ein
Antigen oder Hapten und als enzymmarkierte Komponente
einen Antikörper verwendet.

10

15

20


25


30

35

0054675

1/2







Europäisches
Patentamt

EUROPÄISCHER RECHERCHENBERICHT

0054675

EP 81 10 8754

| EINSCHLÄGIGE DOKUMENTE | | | KLASSIFIKATION DER ANMELDUNG (Int. Cl.) |
|--|--|-------------------|--|
| Kategorie | Kennzeichnung des Dokuments mit Angabe, soweit erforderlich, der maßgeblichen Teile | betrifft Anspruch | |
| Y | US - A - 3 839 153 (SCHUURS et al.) * Zusammenfassung; Beispiele I,II,III,IV * & DE - A - 2 164 768 -- | 1-8 | G 01 N 33/54 |
| Y | DE - A - 2 938 646 (BECTON) * Ansprüche 1,2,6; Seite 28, Zeilen 15-35; Seite 29, Zeilen 1-30 * -- | 1,2,6, 7 | |
| A | FR - A - 2 418 463 (CENTRE NATIONAL DE TRANSFUSION SANGUINE) * Seite 5, Zeilen 35-38; Seite 6, Zeilen 1-25; Seite 14, Zeilen 23-38; Seite 15, Zeilen 1-34 * & DE - A - 2 907 198 -- | 1 | G 01 N |
| DA | FR - A - 2 365 124 (BOEHRINGER MANNHEIM) * Seite 3, Zeile 24 - Seite 5, Zeile 38 * & DE - A - 2 736 527 ---- | 2-8 | |
| | | | KATEGORIE DER GENANNTEN DOKUMENTE |
| | | | X: von besonderer Bedeutung allein betrachtet Y: von besonderer Bedeutung in Verbindung mit einer anderen Veröffentlichung derselben Kategorie A: technologischer Hintergrund O: nichtschriftliche Offenbarung P: Zwischenliteratur T: der Erfindung zugrunde liegende Theorien oder Grundsätze E: älteres Patentdokument, das jedoch erst am oder nach dem Anmeldedatum veröffentlicht worden ist D: in der Anmeldung angeführtes Dokument L: aus andern Gründen angeführtes Dokument |
| | | | & Mitglied der gleichen Patentfamilie, übereinstimmendes Dokument |
| Der vorliegende Recherchenbericht wurde für alle Patentansprüche erstellt. | | | |
| Recherchenort | Abschlußdatum der Recherche | Prüfer | |
| Den Haag | 05-04-1982 | DE LUCA | |

**This Page is Inserted by IFW Indexing and Scanning
Operations and is not part of the Official Record**

BEST AVAILABLE IMAGES

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images include but are not limited to the items checked:

- ☒ **BLACK BORDERS**
- ☐ **IMAGE CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES**
- ☐ **FADED TEXT OR DRAWING**
- ☒ **BLURRED OR ILLEGIBLE TEXT OR DRAWING**
- ☐ **SKEWED/SLANTED IMAGES**
- ☐ **COLOR OR BLACK AND WHITE PHOTOGRAPHS**
- ☐ **GRAY SCALE DOCUMENTS**
- ☐ **LINES OR MARKS ON ORIGINAL DOCUMENT**
- ☐ **REFERENCE(S) OR EXHIBIT(S) SUBMITTED ARE POOR QUALITY**
- ☐ **OTHER:** _____

IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

As rescanning these documents will not correct the image problems checked, please do not report these problems to the IFW Image Problem Mailbox.